

# 病害虫防除技術情報第10号

平成 26 年 7 月 30 日  
三重県病害虫防除所

## オオタバコガの発生に注意してください！

- 1 対象作物:野菜類(イチゴ、トマト、アブラナ科野菜など)、花き類(キクなど)、ダイズ
  - 2 病害虫名:オオタバコガ
  - 3 発生状況:多い
- (1) 県予察圃(松阪市嬉野川北町)におけるフェロモントラップ誘殺数は、6月第6半旬~7月第5半旬では147頭(平年15.7頭)と多い状況です(図)。
- (2) 1か月予報(7月24日・名古屋地方气象台発表)によると、平年と同様に晴れの日が多い見込みであり、オオタバコガの発生に好適な条件であると考えられるため、注意が必要です。




図. フェロモントラップによるオオタバコガ成虫の誘殺消長  
(調査場所:松阪市嬉野川北町)

#### 4 防除上の注意事項

- (1) 老齢になるに従って薬剤の効果が劣ります。若齢幼虫のうちに防除してください。
- (2) 多発すると防除が困難になるので、早期防除に努めてください。
- (3) 施設では、開口部に防虫ネット(目合い 4mm 以下)を張って、成虫の侵入や産卵を防止してください。
- (4) 野菜類では、育苗期や定植直後に発生すると被害が大きいのので、こまめに見回り、発生初期の防除に努めてください。
- (5) 花き類では、生長点付近や花蕾を加害されると商品価値がなくなるので、早期発見に努め、登録のある農薬で防除してください。
- (6) ダイズでは、オオタバコガで登録のある農薬がないため、豆類(種実)で登録のある農薬で防除してください。

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください。