

病害虫防除技術情報第6号

平成25年6月14日

三重県病害虫防除所

茶園においてカンザワハダニが急増しています。

1 対象作物：チャ

2 対象病害虫名：カンザワハダニ

3 発生状況

(1) 県予察圃(亀山市:6月上旬)では、寄生葉率9.0%(平成3.9%)と多、多くの葉に寄生しており、薬剤散布後も発生が多い状況です。

(2) 巡回調査圃場(6月第2週)では、発生圃場率50.0%(平成28.0%)と多、寄生葉率10.9%(平成3.5%)と多、寄生頭数0.25頭/葉(平成0.15頭/葉)とやや多の状況です(表)。

(3) 一般圃場(6月上旬)では、発生量が多い状況です。

(4) 1か月予報(6月7日発表)によると、気温は高い予想です。6月後半以降は平成と同様に曇りや雨の日が多い予想です。

表 巡回調査圃場(6月第2週)におけるカンザワハダニ発生状況

調査年	発生圃場率(%)	寄生葉率(%)	寄生頭数(頭/葉)
本年	50.0	10.9	0.25
平成(10年平均)	28.0	3.5	0.14

県全体平均。新葉50葉調査。

4 防除対策

(1) 多発すると防除が困難になります。実際の圃場での発生状況を確認して防除しましょう。

(2) 葉裏に生息しているため、薬剤は丁寧に散布してください。

(3) 世代交代が早く、薬剤抵抗性を獲得しやすいため、同一系統薬剤の連用は避けください。

(4) ケナガカブリダニやハダニアザミウマなどの土着天敵が活動している圃場では、これらに影響の小さい薬剤で防除して下さい。

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください。