


病虫害防除技術情報第9号

平成 23 年 8 月 30 日
三重県病虫害防除所

オオタバコガの発生に注意してください

- 1 対象作物：野菜類・花き類（キクなど）
- 2 対象病虫害名：オオタバコガ
- 3 発生状況
 - 1) 県予察圃（松阪市嬉野川北町）におけるフェロモントラップ誘殺数は、5 月以降平年より多く推移しており、7 月第 6 半旬～8 月第 5 半旬では 44 頭（平年 6.3 頭）と多い状況です（図）。
 - 2) 発生は 11 月下旬まで続き、今後さらに発生量が増加する時期のため、注意が必要です。



図．フェロモントラップによるオオタバコガ成虫の誘殺消長
(調査場所：松阪市嬉野川北町)

- 4 防除上の注意事項
 - 1) 多くの野菜類、花き類を加害する広食性の害虫です。
 - 2) 卵は茎や葉の先端、花蕾に産みつけられます。また、幼虫は茎、葉、花蕾、果実などを加害し、特に新芽や花蕾、果実では、内部に潜り込んで食害します。
 - 3) 圃場をよく見回り、幼虫や被害部位の早期発見に努めてください。
 - 4) 幼虫は老齢になるに従って薬剤の効果が劣ります。若齢幼虫のうちに防除してください。
 - 5) 被害部位や植物残渣には、内部に幼虫が潜んでいる場合があります。圃場外に持ち出して適切に処分してください。
 - 6) 施設では、開口部に防虫ネットなどを張り、成虫の侵入や産卵を防いでください。
 - 7) 農薬は、ラベルの表示を確認して正しく使用してください。