

# 病害虫防除技術情報第 1 号

平成 20 年 4 月 18 日

三重県病害虫防除所

## コムギ赤かび病の防除時期が近づきました

1. 対象作物：コムギ
2. 対象病害名：赤かび病
3. 出穂期：出穂期は平年並です。出穂から 7～10 日後に開花が予想されます。

三重県農業研究所(松阪市)におけるコムギ出穂期

品 種	平成20年	平 年
あやひかり	4月12日	4月12日 (9年平均)
ニシノカオリ	4月12～13日	4月10日 (9年平均)
タマイズミ	4月12～13日	4月13日 (8年平均)
農林61号	4月14日	4月14日 (10年平均)

註) 作物研究課におけるムギ奨励品種決定調査による

#### 4. 防除適期

開花期の降雨によって、赤かび病に感染するので、開花始め～開花盛期が防除適期です。

#### 5. 発生地域：県内全域

#### 6. 防除上注意すべき事項

- (1) 圃場ごとの出穂・開花状況を把握し、予防防除に努めてください。
- (2) 収穫前日数、散布回数に注意して薬剤を選定してください。

防除薬剤の例（無人ヘリ散布は除く）

薬剤名	使用濃度	使用基準 (時期/回数)
トリフミン乳剤	1,000 倍	収穫 3 日前まで / 3 回以内
チルト乳剤 25	1,000～ 2,000 倍	収穫 3 日前まで / 3 回以内
トップジン M 水和剤	1,000～ 1,500 倍	収穫 14 日前まで / 3 回以内 (出穂期以降は 2 回以内)
シルバキュアフロアブル	2,000 倍	収穫 14 日前まで / 2 回以内