

# 病虫害防除技術情報第 2 号

平成 1 8 年 5 月 2 5 日

三重県病虫害防除所

- 1 . 対象作物：コムギ
- 2 . 対象病虫害名：赤かび病
- 3 . 発生状況：5 月中旬まではほとんど発生が見られませんでした。5 月下旬に入ってから急増している圃場が目立ちます。特に品種“あやひかり”で発生が多い傾向があります。
- 4 . 発生地域：県内全域（特に北勢・中勢）
- 5 . 発生原因：
  - ( 1 ) コムギの開花が遅れたことに加え 5 月第 2 半旬以降の連続的な降雨が発生を助長
  - ( 2 ) 5 月第 5 半旬以降気温が上昇
- 6 . 防除上注意すべき事項
  - ( 1 ) 発生が多く見られる圃場では早急に追加防除を検討してください。
  - ( 2 ) 収穫前日数、散布回数を考慮して薬剤を選定してください。
- 7 . 防除薬剤の例（無人ヘリ散布は除く）

薬剤名	使用濃度または 使用量	使用基準 ( 時期 / 回数 )
トリフミン乳剤	1,000 倍	収穫 3 日前まで / 3 回以内
チルト乳剤 25	1,000 ~ 2,000 倍	収穫 3 日前まで / 3 回以内