

麻しん（はしか）患者の発生について（第 2 1 報）

平成 31 年 3 月 20 日（水）に鳥羽市内の医療機関から、22 日（金）に伊勢市内の医療機関から、それぞれ 1 名の麻しん（はしか）患者の届出が伊勢保健所にあります。

本公表は、患者と接触した方が、麻しんに感染している可能性があるために、広く情報提供を行うものです。

【今回、判明した患者の概要】

	性別	年代	居住地	予防接種歴	発生日	結果判明日	備考
患者 5 2	女性	40 歳代	鳥羽市	2 回	3 月 20 日	3 月 20 日	患者 5 1 と医療機関で接触
患者 5 3	女性	30 歳代	鳥羽市	不明	3 月 22 日	3 月 20 日	患者 5 1 と医療機関で接触

・上記 2 名については、修飾麻しん※としての届出です。

※過去のワクチン接種などで麻しんに対する免疫を有しているものの不十分であった人が、麻しんウイルスの感染を受けた際に、典型的な麻しんより軽い症状を呈した場合に「修飾麻しん」と呼んでいます。修飾麻しんは濃厚接触した場合には周囲への感染源になり得ますが、典型的な麻しんほど感染力は強くないとされています。

【患者が不特定多数の方と接触した可能性のある施設と交通機関】

（施設）

患者が利用した時間帯	施設
3 月 17 日（日） 11 時 30 分頃	飲食店 A（大阪市淀川区内）
12 時～14 時 30 分頃	メルパルクホール（大阪市淀川区内）
16 時～17 時頃	大型商業施設（大阪市内）
18 時頃	飲食店 B（大阪市中心区内）
3 月 19 日（火） 9 時頃	コンビニエンスストア（鳥羽市内）

（交通機関）

患者が利用した時間帯	交通機関
3 月 17 日（日） 8 時頃 発 10 時 30 頃 着	近畿日本鉄道 鳥羽駅⇒大阪難波駅
11 時頃	大阪メトロ御堂筋線 なんば駅⇒新大阪駅
15 時頃	大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅⇒なんば駅
19 時頃 発 21 時頃 着	近畿日本鉄道 大阪難波駅⇒鳥羽駅

「メルパルク大阪」様、「近畿日本鉄道」様、「Osaka Metro」様におかれましては、感染拡大防止のために公表にご協力いただきました。

※麻しんウイルスは空気中や物体表面での生存は 2 時間以下とされていますので、本公表時点で当該場所での感染の恐れはありません。

【県民の皆様へ】

麻疹（はしか）を疑うような症状（高熱・発疹・咳・鼻水・目の充血等）が現れた場合は、必ず事前に医療機関へ連絡し、麻疹（はしか）の疑いがある事を伝えてください。受診の際は公共交通機関の利用を控えて医療機関の指示に従って受診をしてください。

※患者と接触した可能性のある方については、個別に注意喚起を行っています。

麻疹（はしか）は感染力が強く、空気感染するため、手洗い、マスクのみでは予防できません。しかし、ワクチンを必要回数接種していれば、麻疹（はしか）に感染する可能性はワクチン接種をしていない人と比べるとはるかに低くなることから、ワクチン接種が最も効果的な予防法です。そのため、以下のことを確認してください。

また、定期接種対象者でまだ受けてない方は、早めの接種をお勧めします。

<定期接種対象者>

第1期：生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

第2期：5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者

〈確認事項〉

①2回の麻疹ワクチンの予防接種を受けている。

②過去に麻疹にかかったことが明らかである。

③既に発症予防に十分な麻疹抗体価を保有している。

※①から③のいずれにも当てはまらない方は、かかりつけ医療機関に相談のうえ、麻疹ワクチンの接種を検討してください。

【県の対応】

県では、県内保健所を中心に他の関係する自治体とも協力し、接触者の健康観察を詳細に行い、早期に情報を把握し発症時の受診勧奨をする等、感染拡大防止に努めています。

また、教育機関や企業等にも協力を求め、十分な免疫を有していない方々に麻疹ワクチンの接種検討を促す等、感染拡大防止に向け注意喚起を行っていきます。

【参考】麻疹発生状況：届出数（四日市市保健所分を含む）

年	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
三重県	2	7	2	1	5	1	0	6	22	3	53 ^{※1}
全国	732	447	439	283	229	462	35	165	189	282	304 ^{※2}

※1：2019年3月22日（本件含む）現在

※2：2019年3月10日時点