

病害虫防除技術情報第 8 号

令和元年 9 月 20 日

三重県病害虫防除所

トビイロウンカの発生量が増加しています。

普通期水稲では、坪枯れの発生に注意してください。

1. 対象作物 普通期水稲
2. 対象病害虫名 トビイロウンカ
3. 発生状況
 - (1) 予察灯(60w白熱灯、水田位置)で 5 月第 1 半旬から 8 月第 6 半旬にかけて、松阪市で 3 頭(平年 0.2 頭)、紀北町で 5 頭(平年 0 頭)、御浜町で 11 頭(平年 0.9 頭)のトビイロウンカが誘殺されました。
 - (2) 9 月 19 日、津市内の水田において、坪枯れた水稲でトビイロウンカを確認しました。
 - (3) 名古屋地方気象台 9 月 19 日発表の 1 か月予報では気温が高く、特に期間前半はかなり高くなると予報されており、今後も本種の発生に好適な条件が続くと予測されます。
4. 防除対策
 - (1) 収穫期が迫り、薬剤防除ができない水田は、収穫適期の範囲で早めに収穫してください。
 - (2) 早期落水は坪枯れの発生を助長するので、適期落水に努めてください。
 - (3) 薬剤防除を行う場合は、収穫期に近い時期となるため、特に使用時期(収穫前日数)等の使用基準に注意してください。
 - (4) 本種は株元に生息するので、薬剤を散布する場合は株元に十分かかるよう散布してください。
 - (5) 薬剤の使用にあたっては、散布は無風又は風が弱い時に行うなど、近隣に影響が少ない天候や時間帯を選び、風向き、防除器具のノズルの向きにも十分注意するとともに、隣接圃場の農作物の栽培者に対して、薬剤の種類や散布時期等を事前に連絡するなど、薬剤の飛散(ドリフト)に留意してください。

農薬(薬剤)はラベルの表示を確認して、正しく使用してください。