


ブドウ「クイーンニーナ」の雨よけハウス栽培における


収穫適期と選果の判定指標 利用対象：ブドウ生産者

- 「クイーンニーナ」の雨よけハウス栽培では、満開時のジベレリン処理後 90 日で果汁成分の出荷基準を満たします。
- 一部に完全着色に達しない果房も含まれるためカラーチャートによる外観評価と併用した収穫・選果が必要です。



「クイーンニーナ」は満開時のジベレリン処理後日数が 90 日を超えて収穫した果房は糖度 18 Brix%以上、酸度 0.5%未満となり果汁成分の出荷基準を満たします。

満開時ジベレリン処理後日数と果実糖度(Brix)と酸度との関係



「安芸クイーン」専用果実カラーチャート

満開時ジベレリン処理後日数と果房中の着色程度 3 以上の果粒割合および糖度(Brix)との関係

満開時ジベレリン処理後日数が 90 日以上果房でも、「安芸クイーン」専用果実カラーチャートで 3 以上の果粒割合は 75~99%の幅があります。着色のそろった果房を出荷するには、カラーチャートを用いて着色程度を確認して収穫するか、もしくは収穫後の選果が必要になります。

お問い合わせ先	伊賀農業研究室 中央農業改良普及センター	近藤宏哉 西川 豊	電話 0595-37-0211 電話 0598-42-6707
参考になる資料	http://www.pref.mie.lg.jp/nougi/hp/74882027005.htm		