



鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協  
鳥羽市農水商工課、同市水産研究所  
志摩市産業振興部水産課、三重県

【概況】

- ・ 5月から令和3年度の調査を開始しました。  
(当面は月1回の頻度で更新します。)
- ・ 水深3mの水温は、鳥羽市管内(5/31)は19~20℃台、的矢湾(5/16)は18℃台、英虞湾(5/17)は20℃台でした。
- ・ 珪藻類は鳥羽市管内で非常に多い状況でした。



【結果】

	桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ 浜	浦村 大村	的矢	三ヶ所	神明
月日	5/31							5/19	5/17	
時刻	13:19	13:54	14:17	14:29	14:48	14:54	15:03	10:30	10:10	10:28
水深(m)	20.4	9.2	19.2	24.0	8.3	7.4	9.3	10.2	8.7	5.1
水温(℃) 0.5m	21.0	21.7	20.6	20.5	20.4	20.7	20.4	20.0	19.5	21.1
3m	20.7	20.8	20.1	20.4	20.0	19.9	19.5	18.6	18.4	20.6
5m	20.3	20.1	19.3	19.6	19.6	19.8	19.0	18.2	18.1	20.4
塩分 0.5m	21.2	23.8	24.5	25.1	25.7	25.5	25.7	31.2	31.6	32.4
3m	21.7	24.2	25.0	25.2	26.2	26.4	27.1	33.1	33.1	32.8
5m	22.1	24.7	26.5	26.3	27.0	27.1	27.5	33.3	33.3	33.1
溶存酸素量 0.5m	9.8	9.3	9.3	9.3	9.1	9.1	9.1	7.2	7.6	7.1
(mg/l) 3m	9.7	9.3	9.2	9.3	9.1	9.0	8.8	7.1	7.1	7.2
5m	9.4	8.8	8.4	9.1	8.8	9.0	8.5	6.7	6.7	7.2
珪藻類(細胞/ml)										
・水深3mの細胞数	11,800	15,540	15,140	13,720	16,100	15,020	11,900	30	10	60
・二枚貝の餌になる										

溶存酸素量の基準(水産用水基準): 貝類では3.6mg/lを下回ると異常をきたすものが始まります。

特記事項: 特にありません。