

病害虫発生予察注意報第2号

令和4年8月2日
三重県病害虫防除所

**果樹カメムシ類が、継続して多く誘殺されています。
圃場で飛来を確認したら防除を実施してください**

1. 対象作物 : ナシ、カキ、カンキツ等
2. 対象病害虫名 : 果樹カメムシ類
3. 発生地域 : 県内全域
4. 発生時期 : 6月中旬以降
5. 発生量 : 多
6. 注意報発令の根拠

- (1) 予察灯におけるチャバネアオカメムシの誘殺数（6月第5半旬～7月第4半旬）は、松阪市嬉野川北町で2,726頭（平年729.3頭）、南牟婁郡御浜町で67,926頭（平年9564.3頭）と多い状況です（図1）。
- (2) フェロモントラップにおけるチャバネアオカメムシ誘殺数は、松阪市嬉野川北町（6月4週～7月3週）で1,368.7頭（平年332.8頭）、南牟婁郡御浜町（6月下旬～7月中旬）で3,413.5頭（平年643.2頭）と多い状況です（図2）。




図1. 予察灯におけるチャバネアオカメムシの誘殺数
左図：松阪市 右図：御浜町




図2. フェロモントラップにおけるチャバネアオカメムシの誘殺数
 左図：松阪市 右図：御浜町

7. 防除の注意事項

- (1) 飛来数は、圃場による差が大きい傾向があります。気象の変動をきっかけに飛来する可能性も考えられますので、今後の発生動向に注意してください。
- (2) 夜間の照明等への飛来を参考にし、圃場で飛来を確認したら防除を実施してください。
- (3) 過去に飛来が多かった圃場では特に注意してください。
- (4) 近隣圃場と散布日を合わせるなど、広域で一斉防除すると効果が高くなります。
- (5) 合成ピレスロイド系の薬剤を連続して散布することで、ハダニ類、カイガラムシ類の発生が多くなる傾向があるので注意してください。
 薬剤は三重県農薬情報システム

https://www.nouyaku_sys.com/nouyaku/user/top/mie で検索することができます。

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください！