

病害虫発生予察注意報第3号

令和5年9月13日
三重県病害虫防除所

**シロイチモジヨトウが増え続けています。
早期発見・早期防除に努めましょう。**

- 1 対象作物 : ネギ
- 2 対象病害虫名 : シロイチモジヨトウ
- 3 発生地域 : 県内全域
- 4 発生時期 : 7月中旬以降
- 5 発生量 : 多
- 6 注意報発令の根拠

(1) 巡回調査圃場（9月第1～2週）では、青ネギの被害株率 35.8%（平年 2.9%）と過去10年と比較して最も多い状況です。

(2) フェロモントラップにおけるシロイチモジヨトウ誘殺数は、松阪市嬉野川北町（8月第3半旬～9月第2半旬）で379頭（平年 109.6頭）と過去10年と比較して最も多い状況です（図1）。




図1 フェロモントラップにおけるシロイチモジヨトウ成虫の誘殺数
（調査場所：松阪市嬉野川北町）



図2 シロイチモジヨトウによるネギの食害
(いずれも令和5年9月4日撮影)

7 防除の注意事項

- (1) 幼虫は表皮を残して食害するため、被害葉はふんや穴を伴いながら白く透けて垂れ下がります(図2)。こまめにほ場を見回り発生初期の防除に努めてください。
- (2) 薬剤の効果が高い若齢のうちに防除してください。
- (3) シロイチモジヨトウのフェロモントラップ誘殺状況は、以下の野菜の病害虫のページにて随時更新しています。
(<https://www.pref.mie.lg.jp/byogai/hp/39619007432.htm>)
- (4) 防除薬剤は三重県農薬情報システムで検索することができます。
(<https://www.nouyaku-sys.com/nouyaku/user/top/mie>)
- (5) 薬剤抵抗性回避のため、異なる作用機構の薬剤をローテーション散布してください。

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください。