

野生いのししの豚熱免疫獲得率(3か月移動平均、過去1年分)

R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	R7.4月	R7.5月	R7.6月	
23.5%	24.9%	23.1%	22.7%	16.5%	20.2%	20.7%	22.5%	25.3%	18.3%	18.1%	17.8%	22.7%	北勢地域
21.9%	18.2%	17.7%	11.5%	13.5%	12.4%	14.3%	15.2%	25.0%	35.1%	37.8%	55.7%	51.5%	伊賀・名張地域
31.2%	26.3%	16.5%	12.6%	7.1%	14.0%	14.4%	16.8%	23.0%	30.2%	36.8%	56.7%	45.1%	中勢地域
53.2%	43.4%	36.5%	35.7%	36.5%	34.1%	17.7%	19.5%	25.9%	35.4%	36.0%	31.9%	23.6%	南勢地域
23.7%	27.0%	27.0%	22.8%	13.0%	9.8%	12.3%	16.7%	16.4%	16.7%	13.6%	13.0%	10.3%	東紀州地域
34.8%	31.9%	28.6%	27.3%	23.6%	18.5%	15.9%	18.2%	23.7%	29.0%	30.3%	34.0%	29.8%	三重県全域

※免疫獲得は、野外抗体と経口ワクチン抗体を区別していません。

※数値にばらつきがあるため、その月を含む3か月間の平均で集計しています。