

令和7年度 黒のり漁場栄養塩調査表(第2回)

分析日: 令和7年10月15日

漁場名		採水日	採水時刻	水温		比重		DIN(μg/L)		PO4-P(μg/L)	
				今回	前回	今回	前回	今回	前回	今回	前回
					10月8日		10月8日		10月8日		10月8日
桑名	木曽岬	10月14日	8:40	23.3	23.5	22.2	9.9	184	376	12	35
	伊曽島(新田)	10月14日	9:00	22.8	23.8	21.4	16.8	234	241	26	39
	城南	10月12日	11:45	23.2	24.0	19.9	18.3	10	181	2	29
鈴鹿	下箕田	10月14日	10:00	23.1	24.3	22.2	21.4	21	13	5	2
	浜田	10月14日	9:00	23.0	21.0	19.9	21.4	344	6	43	8
	白子	10月14日	10:30	23.0	25.0	22.2	22.9	20	43	6	15
白塚港前		—	—	—	24.1	—	22.9	—	116	—	26
松阪	東黒部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
伊勢湾	大淀	10月14日	7:30			22.9	22.9	75	12	10	4
	今一色(台場)	10月14日	6:30			22.9	22.9	158	41	24	14
鳥羽磯部	桃取町	10月14日	7:00	23.3	24.0	23.7	23.7	48	33	15	12
	大答志	10月14日	8:50	23.6		25.2	24.4	65	62	19	18
	答志上手	10月14日	8:40	23.4		23.7	24.4	50	34	16	13
	菅島(表)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	菅島(裏)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	安楽島	10月14日	7:30	23.4	23.6	25.2	25.2	64	53	17	15

※DIN…アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素の総量


※PO4-P…リン酸態リン

※白抜きは不明、-は欠測


【ノリの生育条件】		水 温	比 重	DIN (μ g/L)	PO4-P (μ g/L)
好適条件		8～13	15～24	100～400	10～50
概況など	白子港の水温は平年並、比重は平年より高めで推移しています。				
	珪藻が発生している漁場では、今後の動向に注意してください。				
	潮位は、潮位図に比べて -15 cm ～ +14 cmで推移しています。				
	※「白塚港前」に黒のり漁場はありませんが、定期的に採水をし、情報提供させていただきます。				
桑名	栄養塩量は、木曽岬と新田下で十分量です。城南で極端に少なくなっています。				
鈴鹿	栄養塩量は、浜田で十分量です。下箕田と白子で少なくなっています。				
中勢	—				
南勢	栄養塩量は、大淀でやや少なくなっています。今一色で十分量です。				
鳥羽	栄養塩量は、桃取で少なくなっています。大答志、答志上手、安楽島でやや少なくなっています。				
★栄養塩動向調査(PDF版)はインターネット上で見ることもできます。					
三重県水産研究所 鈴鹿水産研究室 http://www.pref.mie.lg.jp/suigi/hp/16172017481.htm					
三重県漁連 http://www.miegyoren.or.jp/nori/					
右側の二次元コードでもアクセスできます。					
					
		(三重県水産研究所)		(三重県漁連)	

令和7年度 黒のり漁場調査(第2回)

【白子港の水溫】



【白子港の比重】



【プランクトン】

採水日	漁協名	発生密度(cells/mL)
10月14日	木曾岬	2,420
10月14日	伊曽島(新田)	600
10月12日	城南	1,200
10月14日	鈴鹿市	下箕田 530
10月14日		浜田 920
10月14日		白子 680
—	白塚港前	—
—	東黒部	—

採水日	漁協名	発生密度(cells/mL)
10月14日	大淀	50
10月14日	今一色(台場)	45
10月14日	桃取	3
10月14日	大答志	2
10月14日	答志上手(外)	0
—	菅島	表 —
—		裏 —
10月14日	安楽島	4

【名古屋港の潮位偏差(速報値)】

(気象庁)



潮位偏差: 計算上の予測潮位と実測潮位との差

プラスの時は実際の潮位が予想潮位より高く、マイナスの時は低いことを示す。