



鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協  
鳥羽市農林水産課、同市水産研究所  
志摩市水産農林部水産課、三重県

【概況】

- 水深2mの水温は、鳥羽海域では20~21℃台、的矢湾では22℃台でした。
- 水深2mの日平均水温は、昇降を繰り返しながら上昇しています。全地点で20℃を上回りました。
- 珪藻類は全体的に少なくなっています。



【結果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 権現	浦村 大村	的矢	三ヶ所
月日		6/16								6/18	
時刻		9:31	10:10	10:28	10:40	11:03	11:16	11:26	11:42	9:16	9:37
水深 (m)		13.3	9.4	11.8	16.2	8.3	7.4	7.2	8.8	10.9	8.7
水温 (°C)	0.5m	21.2	20.8	20.8	20.7	20.7	21.0	21.5	20.7	22.6	22.6
	2m	21.2	20.8	20.8	20.7	20.6	20.7	20.7	20.7	22.3	22.4
	5m	21.1	20.8	20.8	20.7	20.6	20.5	20.5	20.6	20.9	21.1
	B-1m	20.8	20.8	20.8	20.7	20.5	20.5	20.5	20.6	20.6	20.6
塩分 (ppt)	0.5m	30.3	31.1	31.1	31.3	32.3	32.4	31.6	31.9	29.4	29.6
	2m	30.4	31.1	31.1	31.3	32.3	32.4	32.3	32.0	30.7	30.7
	5m	30.4	31.1	31.0	31.5	32.5	32.6	32.6	32.1	32.6	32.4
	B-1m	31.1	31.2	31.1	31.7	32.7	32.7	32.7	32.2	33.1	33.1
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	7.4	6.7	6.7	6.7	6.9	6.9	6.2	6.7	6.9	6.9
	2m	7.4	6.7	6.7	6.7	6.9	6.6	6.3	6.7	6.9	6.9
	5m	7.4	6.7	6.7	6.6	6.9	6.4	6.7	6.7	6.2	6.1
	B-1m	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.3	6.8	6.7	6.1	5.7
珪藻類 (細胞/mL)	2m	220	50	90	60	20	0	30	50	0	0

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。(例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です)

溶存酸素量の基準 (水産用水基準)：貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが出始めます。