

令和8年度 黒のり漁場栄養塩調査表(第1回)

分析日: 令和8年10月7日

漁場名		採水日	採水時刻	水温		比重		DIN(μg/L)		PO4-P(μg/L)	
				今回	前回	今回	前回	今回	前回	今回	前回
桑名	木曽岬	10月5日	5:55	22.1	—	12.2	—	194	—	19	—
	伊曾島(新田)	10月5日	8:08	23.1	—	19.1	—	147	—	36	—
	城南	10月5日	11:45	23.1	—	19.9	—	48	—	5	—
鈴鹿	下箕田	10月6日	11:10	23.1	—	19.9	—	61	—	5	—
	浜田	10月6日	8:00	23.3	—	19.9	—	115	—	15	—
	白子	10月6日	8:00	23.0	—	19.9	—	137	—	20	—
白塚港前		10月6日	8:00	23.5	—	21.4	—	117	—	30	—
松阪	東黒部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
伊勢湾	大淀	10月5日	17:00		—	20.6	—	17	—	2	—
	今一色(台場)	10月5日	16:00		—	22.2	—	18	—	5	—
鳥羽磯部	桃取町	10月5日	15:00	23.9	—	23.7	—	12	—	4	—
	大答志	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	答志上手	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	菅島(表)	10月5日	11:00	23.6	—	23.7	—	25	—	7	—
	菅島(裏)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	安楽島	10月6日	7:30	23.7	—	24.4	—	31	—	7	—

※DIN…アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素の総量


※PO4-P…リン酸態リン

※白抜きは不明、-は欠測


【ノリの生育条件】		水 温	比 重	DIN(μg/L)	PO4-P(μg/L)
好適条件		8～13	15～24	100～400	10～50
概況など	白子港の水温はやや低め、比重は平年並で推移しています。				
	珪藻が発生している漁場では、今後の動向に注意してください。優占種は小型珪藻(スケルトネマ属)です。				
	潮位は、潮位図に比べて -16 cm ～ 21 cmで推移しています。				
	※「白塚港前」に黒のり漁場はありませんが、定期的に採水をし、情報提供させていただきます。				
桑名	栄養塩量は城南で少なくなっています。その他で十分量です。				
鈴鹿	栄養塩量は、下箕田でやや少なくなっています。その他で十分量です。				
中勢	栄養塩量は、十分量です。				
南勢	栄養塩量は、大淀、今一色(台場)で極端に少なくなっています。				
鳥羽	栄養塩量は、桃取町で極端に少なくなっています。菅島(表)、安楽島で少なくなっています。				
☆栄養塩動向調査(PDF版)はインターネット上で見ることもできます。					
三重県水産研究所 鈴鹿水産研究室 http://www.pref.mie.lg.jp/suigi/hp/16172017481.htm					
三重県漁連 http://www.miegyoren.or.jp/nori/					
右側の二次元コードでもアクセスできます。					
 					
(三重県水産研究所) (三重県漁連)					

令和8年度 黒のり漁場調査(第1回)

【白子港の水温】



【白子港の比重】




【プランクトン】

採水日	漁協名	発生密度 (cells/mL)
10月5日	木曽岬	3,490
10月5日	伊曽島(新田)	3,510
10月5日	城南	6,310
10月6日	鈴鹿市	下箕田 5,860
10月6日		浜田 3,550
10月6日		白子 1,955
10月6日	白塚港前	540
—	東黒部	—

採水日	漁協名	発生密度 (cells/mL)
10月5日	大淀	8,910
10月5日	今一色(台場)	2,900
10月5日	桃取	1,170
—	大答志	—
—	答志上手	—
10月5日	菅島	表 335
—		裏 —
10月6日	安楽島	250

【名古屋港の潮位偏差(速報値)】

(気象庁)



潮位偏差: 計算上の予測潮位と実測潮位との差

プラスの時は実際の潮位が予想潮位より高く、マイナスの時は低いことを示す。