

病害虫発生予察注意報第5号

平成22年9月17日

三重県病害虫防除所

1. 対象作物：ネギ
2. 害虫名：シロイチモジヨトウ
3. 発生地域：全域
4. 発生時期：9月下旬～10月下旬
5. 発生量：多い
6. 注意報発令の根拠

- 1) シロイチモジヨトウの8月4半旬～9月3半旬の県予察圃（松阪市嬉野川北町）でのフェロモントラップへの飛来数（384頭）は平年（122頭）に比べ、多くなっています（図）。
- 2) 巡回調査圃場（9月第2週、伊勢市）では、被害葉率6.3%（平年3.6%）と多い状況です。
- 3) シロイチモジヨトウの発生は平年の状況を考慮すると、今後も多発が続く可能性があります。




図. フェロモントラップによるシロイチモジヨトウ成虫の誘殺消長
(調査場所:松阪市嬉野川北町)

7. 防除対策と注意事項

- 1) 老齢になるにしたがって薬剤の効果が劣るので、発生時期に注意し、若齢幼虫のうちに防除してください。
- 2) 同一系統薬剤を連用すると、薬剤抵抗性を獲得しやすいため、異なる系統薬剤をローテーション散布してください。
- 3) 必要な場合は展着剤を加用し、薬液が葉面によくかかるように、ていねいに散布してください。
- 4) 農薬は、ラベルの表示を確認して正しく使用してください。