

病虫害防除技術情報第2号

令和5年4月27日

三重県病虫害防除所

ミカンハダニが増えています！

- 1 対象作物 温州みかん、中晩柑類
- 2 対象病虫害名 ミカンハダニ
- 3 発生状況 紀州地域:多
 - 1) 県予察圃(御浜町:4月上旬)では、寄生頭数は慣行防除区 0.19 頭/葉(平年 0.001 頭/葉) と平年より多い状況です(図1)。
 - 2) 巡回調査圃場(4月第2~3週)では、寄生葉率は 6.31%(平年 4.4%)、寄生頭数は 0.96 頭/葉(平年 0.24 頭/葉)と平年より多い状況です。
 - 3) 一般圃場(4月)では、紀州地域で平年より多い状況です。
 - 4) 1か月予報(4月20日名古屋地方気象台発表)によると、降水量は平年並か多く、気温は平年並か低い予報ですが、期間の後半(5月6日~5月19日)は平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
 - 5) 今後気温が高くなるとミカンハダニが増加しやすい状況となります。
- 4 防除対策
 - 1) 発生密度が高くなると防除が困難になります。1葉当りの成虫寄生数が0.5~1.0頭程度を目安に防除してください。
 - 2) ミカンハダニは葉裏に生息しているため、薬剤は葉裏にかかるように散布してください。
 - 3) マシン油乳剤での防除は、樹勢が衰弱している場合や高温時の散布では落葉等の葉害が発生しやすいため使用を避けてください。
 - 4) 薬剤抵抗性回避のため、同一年における同一系統薬剤の連用は避け、系統の異なる薬剤のローテーション使用を行ってください。

裏面に続きます




図1 県予察圃(御浜町)におけるミカンハダニの発生消長
※慣行防除区

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください。