

野生いのししの豚熱免疫獲得率(3か月移動平均、過去1年分)

| R6.9月 | R6.10月 | R6.11月 | R6.12月 | R7.1月 | R7.2月 | R7.3月 | R7.4月 | R7.5月 | R7.6月 | R7.7月 | R7.8月 | R7.9月 |         |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 22.7% | 16.5%  | 20.2%  | 20.7%  | 22.5% | 25.3% | 18.3% | 18.1% | 17.8% | 22.7% | 19.2% | 14.5% | 10.8% | 北勢地域    |
| 11.5% | 13.5%  | 12.4%  | 14.3%  | 15.2% | 25.0% | 35.1% | 37.8% | 55.7% | 51.5% | 51.5% | 40.0% | 30.9% | 伊賀・名張地域 |
| 12.6% | 7.1%   | 14.0%  | 14.4%  | 16.8% | 23.0% | 30.2% | 36.8% | 56.7% | 47.9% | 46.2% | 30.3% | 27.9% | 中勢地域    |
| 35.7% | 36.5%  | 34.1%  | 17.7%  | 19.5% | 25.9% | 35.4% | 36.0% | 31.9% | 23.6% | 15.4% | 17.8% | 22.9% | 南勢地域    |
| 22.8% | 13.0%  | 9.8%   | 12.3%  | 16.7% | 16.4% | 16.7% | 13.6% | 13.0% | 10.3% | 6.7%  | 10.8% | 14.0% | 東紀州地域   |
| 27.3% | 23.6%  | 18.5%  | 15.9%  | 18.2% | 23.7% | 29.0% | 30.3% | 34.0% | 30.3% | 24.7% | 19.5% | 20.5% | 三重県全域   |

※免疫獲得は、野外抗体と経口ワクチン抗体を区別していません。

※数値にはばらつきがあるため、その月を含む3か月間の平均で集計しています。