


カキ養殖漁場環境・モニタリング速報

令和8年1月29日

鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協


鳥羽市農林水産課、同市水産研究所

志摩市水産農林部水産課、三重県



【概況】

- 水深 2m の水温は、鳥羽海域で 8~11°C台、的矢湾で 10~11°C台、英虞湾では 11°C台でした。
- 水深 2m の日平均水温は、12月中旬に比べ 2~3°C低下しており、桃取、小浜、権現では 10°Cを下回っています。
- 珪藻類は小田ノ浜で多く、1,430 細胞/mL が確認されました。



【結果】

	桃取	小浜	安樂島 高山	安樂島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 大村	浦村 権現	的矢	三ヶ所	神明	
月日	1/27								1/21		1/19	
時刻	9:11	9:25	9:38	9:47	10:01	10:08	10:23	10:15	12:08	10:20	10:17	
水深 (m)	14.7	10.6	13.5	18.3	9.9	8.9	11.1	8.9	10.4	8.7	4.9	
水温 (°C)	0.5m	9.2	9.6	10.5	11.3	10.7	10.7	10.8	8.6	11.1	10.5	10.6
	2m	9.4	9.6	10.8	11.4	10.7	10.7	10.8	8.9	11.1	10.5	11.3
	5m	9.5	9.6	10.9	11.4	10.7	10.6	10.8	10.1	11.6	10.4	
	B-1m	9.9	9.6	11.1	11.4	10.1	10.6	10.6	9.9	12.0	10.4	11.4
塩分 (ppt)	0.5m	32.9	33.0	33.4	33.8	33.6	33.5	33.6	33.1	33.6	33.5	33.4
	2m	32.9	33.0	33.5	33.8	33.6	33.6	33.6	33.1	33.6	33.5	33.5
	5m	33.0	33.0	33.6	33.8	33.6	33.6	33.6	33.5	33.8	33.5	
	B-1m	33.1	33.0	33.7	33.8	33.6	33.6	33.6	33.5	34.0	33.5	33.7
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	8.6	8.5	8.2	7.9	8.2	8.2	8.1	9.2	9.0	9.1	9.3
	2m	8.5	8.5	8.1	7.9	8.2	8.2	8.1	9.1	9.0	9.2	9.2
	5m	8.6	8.5	8.0	7.9	8.2	8.2	8.1	8.4	8.8	9.2	
	B-1m	8.4	8.5	7.9	7.9	8.5	8.2	8.2	8.5	8.7	9.2	9.3
珪藻類 (細胞/mL)	2m	40	30	200	30	20	1,430	10	50	140	190	0

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。（例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です）

溶存酸素量の基準（水産用水基準）：貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが始めます。