


鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協

鳥羽市農林水産課、同市水産研究所
志摩市水産農林部水産課、三重県

【概況】

- 水深2mの水温は、鳥羽海域では27～28℃台、的矢湾では27℃台でした。
- 水深2mの日平均水温は、すべての海域において上下変動を繰り返しており、現在は両海域で約27℃になっています。
- 珪藻類は両海域で少なくなっています。



【結果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 権現	浦村 大村	的矢	三ヶ所
月日		8/25								8/19	
時刻		9:13	9:34	9:52	10:01	10:19	10:24	10:31	11:13	9:11	10:30
水深 (m)		13.2	9.0	13.3	18.2	8.9	7.7	7.8	9.5	10.7	8.8
水温 (°C)	0.5m	28.4	27.9	27.7	27.4	27.9	28.1	28.7	28.1	28.3	28.7
	2m	28.3	27.9	27.5	27.3	27.1	27.3	27.8	27.4	27.2	27.6
	5m	27.8	27.9	27.4	27.2	26.5	26.4	26.6	26.9	25.7	25.7
	B-1m	27.3	27.8	26.5	25.8	26.1	26.2	26.2	26.1	25.5	25.4
塩分 (ppt)	0.5m	30.8	31.3	31.7	31.8	32.1	32.2	32.3	32.2	31.3	31.3
	2m	30.8	31.4	31.7	31.9	32.3	32.2	32.3	32.2	32.2	32.2
	5m	31.3	31.5	31.7	31.9	32.5	32.6	32.5	32.3	33.0	32.9
	B-1m	31.7	31.5	32.3	32.9	32.7	32.7	32.6	32.7	33.2	33.1
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	6.0	5.7	5.6	5.6	5.1	5.2	5.3	5.3	6.4	6.4
	2m	6.0	5.7	5.5	5.5	5.2	5.0	5.1	5.2	5.6	5.9
	5m	5.7	5.6	5.5	5.5	5.2	4.8	4.4	4.9	4.9	4.0
	B-1m	5.4	5.6	4.8	5.0	4.5	4.2	4.1	4.8	5.2	4.7
珪藻類 (細胞/mL)	2m	0	0	0	120	0	0	0	0	200	330

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。(例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です)

溶存酸素量の基準 (水産用水基準)：貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが始めます。