

令和8年度 黒のり漁場栄養塩調査表(第4回)

分析日: 令和8年10月28日

漁場名		採水日	採水時刻	水温		比重		DIN(μg/L)		PO4-P(μg/L)	
				今回	前回	今回	前回	今回	前回	今回	前回
桑名	木曽岬	10月25日	7:30	22.2	20.5	22.9	10.7	169	162	54	12
	伊曽島(新田)	10月25日	7:30	22.6	22.6	23.7	19.9	146	123	67	43
	城南	10月26日	6:50	21.9	23.0	21.4	22.2	147	22	39	9
鈴鹿	下箕田	10月27日	14:00	21.3	21.5	21.4	19.9	99	204	27	24
	浜田	10月27日	12:00	22.0	23.1	20.6	19.9	169	47	36	6
	白子	10月28日	9:00	21.0	22.5	22.9	21.4	131	14	35	7
白塚港前		10月28日	7:30	22.5	22.8	24.4	22.9	214	138	52	30
松阪	東黒部	10月27日	9:00		22.8	16.8	20.6	199	156	29	24
伊勢湾	大淀	10月27日	7:00		23.0	17.6	23.7	217	17	42	9
	今一色(台場)	10月27日	8:00			21.4	15.3	120	804	24	105
	今一色(支柱場)	10月26日			22.5	20.4	23.7	314	512	210	459
鳥羽磯部	桃取町	10月26日	10:00	22.6	23.3	22.2	25.2	55	20	18	10
	大答志	—	—	—		—	25.2	—	35	—	10
	答志上手	—	—	—		—	24.4	—	19	—	15
	菅島(表)	10月26日	15:30	22.6	22.8	24.4	24.4	53	40	15	6
	菅島(裏)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	安楽島	10月27日	8:00	22.5	—	24.4	—	49	—	13	—

※DIN…アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素の総量


※PO4-P…リン酸態リン

※白抜きは不明、-は欠測


【ノリの生育条件】		水 温	比 重	DIN (μ g/L)	PO4-P (μ g/L)
好適条件		8～13	15～24	100～400	10～50
概況など	白子港の水温、比重はともに平年よりやや高めで推移しています。				
	珪藻の発生密度は低くなりましたが、今後の動向に注意してください。優占種は小型珪藻(スケルトネマ属)です。				
	潮位は、潮位図に比べて－28 cm ～ ＋9 cmで推移しています。				
	※「白塚港前」に黒のり漁場はありませんが、定期的に採水し、情報提供します。				
桑名	栄養塩量は、十分量です。				
鈴鹿	栄養塩量は、十分量です。				
中勢	栄養塩量は、十分量です。				
南勢	栄養塩量は、十分量です。				
鳥羽	栄養塩量は、安楽島で少なく、桃取町と菅島(表)でやや少なくなっています。				
★栄養塩動向調査(PDF版)はインターネット上で見ることもできます。					
三重県水産研究所 鈴鹿水産研究室 http://www.pref.mie.lg.jp/suigi/hp/16172017481.htm					
三重県漁連 http://www.miegyoren.or.jp/nori/					
右側の二次元コードでもアクセスできます。					
 (三重県水産研究所)  (三重県漁連)					

令和8年度 黒のり漁場調査(第4回)

【白子港の水溫】



【白子港の比重】




【プランクトン】

採水日	漁協名	発生密度(cells/mL)
10月25日	木曽岬	2,270
10月25日	伊曽島(新田)	365
10月26日	城南	1,870
10月27日	鈴鹿市	下箕田 10,580
10月27日		浜田 5,590
10月28日		白子 1,275
10月28日	白塚港前	1,200
10月27日	東黒部	2,120

採水日	漁協名	発生密度(cells/mL)
10月27日	大淀	1,110
10月27日	今一色(台場)	20
10月26日	桃取	470
—	大答志	—
—	答志上手	—
10月26日	菅島	表 65
—		裏 —
10月27日	安楽島	190

【名古屋港の潮位偏差(速報値)】

(気象庁)



潮位偏差: 計算上の予測潮位と実測潮位との差

プラスの時は実際の潮位が予想潮位より高く、マイナスの時は低いことを示す。